

Listado de países¹

Requisitos y recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla y situación del paludismo. Otros requisitos de Vacunación.

Introducción

La información que se ofrece incluye los requisitos sobre la vacunación obligatoria contra la fiebre amarilla, recomendaciones de la OMS sobre la vacunación para viajeros contra la fiebre amarilla y los detalles en relación con la situación del paludismo y la prevención recomendada frente a la enfermedad para cada país.^{2 3}

Fiebre amarilla

Vacunación contra la fiebre amarilla

La vacunación contra la fiebre amarilla se realiza con dos propósitos diferentes:

1. Impedir la propagación internacional de la enfermedad protegiendo a los países del riesgo de importación o propagación del virus de la fiebre amarilla. Estos son requisitos obligatorios establecidos por cada país.

Los países que exigen certificado de vacunación² son aquellos donde la enfermedad puede manifestarse o no y donde están presentes el mosquito vector y posibles primates no humanos hospedadores de la fiebre amarilla. Cualquier importación del virus en estos países por parte de viajeros infectados podría dar lugar a su propagación y establecimiento, originando un riesgo permanente de infección para la población humana. Se exige con frecuencia certificado de vacunación a todos los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y, a veces a viajeros en tránsito por dichos países. Sin embargo una reunión de expertos en fiebre amarilla celebrada en 2010 concluyó que cuando el tránsito en el aeropuerto es inferior a 12 horas, el riesgo de fiebre amarilla es casi inexistente y por lo tanto el certificado de vacunación podría no ser necesario. Se está transmitiendo esta información a los estados miembros de la OMS, pero se recomienda a los viajeros que contacten con las embajadas de los países que tiene pensado visitar, a fin de conocer los requisitos de específicos de cada país. Es importante remarcar que algunos países requieren certificado de vacunación a todos los viajeros.

Los países que exigen vacunación contra la fiebre amarilla para permitir la entrada lo hacen de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional. Los requisitos de los países están sujetos a cambios en cualquier momento. Se pueden encontrar actualizaciones en www.who.int/ith. Este capítulo ofrece información sobre los requisitos de vacunación contra la fiebre amarilla proporcionados por los países.

El hecho de que un país no exija vacunación contra la fiebre amarilla no implica que no exista riesgo de transmisión de la enfermedad.

2. Proteger a cada viajero que puede exponerse a la infección por fiebre amarilla.

El riesgo de transmisión de fiebre amarilla depende de la presencia del virus en el país en personas, mosquitos o animales. Dado que con frecuencia la fiebre amarilla es mortal para

quienes no están vacunados, se recomienda la vacunación a todos los viajeros (con pocas excepciones, Capítulo 6) que van a visitar zonas donde hay riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

La OMS determina aquellas áreas donde “existe un riesgo de transmisión de fiebre amarilla” a partir del diagnóstico de casos de fiebre amarilla en humanos y/o animales, los resultados de las sero-encuestas de fiebre amarilla y la presencia de vectores y reservorios animales.⁴

Las decisiones relativas al uso de la vacuna contra la fiebre amarilla en viajeros han de considerar diversos factores, incluyendo el riesgo de fiebre amarilla asociada al viaje, exigencias del país, y los potenciales efectos adversos tras la vacunación contra la fiebre amarilla (Capítulo 6)

La tabla que hay a continuación resume las recomendaciones revisadas de la OMS para viajeros respecto a la vacunación contra la fiebre amarilla.

Categoría de vacunación contra la fiebre amarilla	Razones para la recomendación
Recomendada	Se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros a partir de 9 meses de edad en áreas donde exista evidencia de transmisión persistente o periódica del virus de la fiebre amarilla.
Generalmente no recomendada	Generalmente, no se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla en áreas donde existe un bajo riesgo de exposición al virus de la fiebre amarilla (no se han notificado casos humanos de fiebre amarilla y la evidencia muestra solamente bajos niveles de transmisión del virus de la fiebre amarilla en el pasado). Sin embargo, debería considerarse la vacunación en aquel subgrupo de viajeros a estas áreas que tengan un aumento del riesgo a exposición a mosquitos o que no puedan evitar las picaduras. Cuando se considere la vacunación, cualquier viajero debe tener en cuenta el riesgo de infección por el virus de la fiebre amarilla, los requisitos de entrada de cada país y los factores de riesgo individuales para desarrollar un efecto adverso grave tras la vacunación (P. Ej. edad, estado inmunitario)

En el Anexo 1 figura la lista de los países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla en todo su territorio o en parte de él, así como la lista de los países que exigen el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla como condición para la entrada.

Otras enfermedades

Cólera. Ningún país exige un certificado de vacunación contra el cólera como condición para la entrada. En el Capítulo 6 se incluye información sobre el uso selectivo de las vacunas contra el cólera.

Viruela. Desde que en 1980 se certificó la erradicación mundial de la viruela, la OMS no recomienda la vacunación contra la viruela para los viajeros.

Otras enfermedades infecciosas. En el Capítulo 5 se ofrece información sobre las principales enfermedades infecciosas que representan una amenaza para los viajeros, su distribución geográfica y las precauciones necesarias. En el Capítulo 6 se ofrece información sobre enfermedades prevenibles con vacuna.

Paludismo (Malaria)

En el Capítulo 7 se incluye información general sobre el paludismo, su distribución geográfica y detalles sobre las medidas preventivas. En el Capítulo 3 se describen medidas contra las picaduras de mosquitos. En la presente sección se ofrece información específica sobre cada país, incluyendo datos epidemiológicos (distribución geográfica y estacional, altitud, especies predominantes, resistencia notificada) de todos los países con zonas palúdicas. También se indica la prevención recomendada. La prevención recomendada para cada país se decide basándose en los siguientes factores: el riesgo de contraer paludismo; las especies de parásitos del paludismo prevalentes en la zona; el nivel y extensión de las resistencias a medicamentos registradas en cada país; y el posible riesgo de efectos secundarios graves como consecuencia del uso de los diferentes medicamentos profilácticos. Allí donde existe tanto *P. falciparum* como *P. vivax* es prioritaria la prevención de la malaria por *falciparum*. A menos que el riesgo de malaria se defina como “exclusivamente” debido a ciertas especies (*P. falciparum* o *P. vivax*), los viajeros podrán infectarse de cualquier parásito, incluyendo las infecciones mixtas. La resistencia de *P. falciparum* a la *cloroquina* ya la *sulfadoxina-pirimetamina* es en la actualidad casi universal y ya no se menciona específicamente en la lista de países relacionada a continuación; estos dos medicamentos actualmente no tienen ningún papel en la prevención o tratamiento de la malaria por *P. falciparum* en los viajeros.

Los números A, B, C y D se refieren al tipo de prevención, basándose en la siguiente tabla:

	Riesgo de paludismo	Tipo de prevención
Tipo A	Riesgo muy limitado de transmisión de paludismo	Sólo prevención de las picaduras de mosquitos
Tipo B	Riesgo de paludismo sólo por <i>P.vivax</i>	Prevención de las picaduras de mosquitos y profilaxis con <i>cloroquina</i> ^a
Tipo C	Riesgo de <i>P. falciparum</i> junto con resistencia notificada a la <i>cloroquina</i> y <i>sulfadoxina-pirimetamina</i>	Prevención de las picaduras de mosquitos y quimioprofilaxis con <i>atovacuona / proguanil</i> , <i>doxiciclina</i> o <i>mefloquina</i> (la selección se hará en función del patrón de resistencia y contraindicaciones) ^a
Tipo D	Riesgo de Malaria por <i>P. falciparum</i> junto con multiresistencia notificada	Prevención de las picaduras de mosquitos y quimioprofilaxis con <i>atovacuona / proguanil</i> , <i>doxiciclina</i> o <i>mefloquina</i> (la selección se hará en función del patrón de resistencia, efectos ecundarios y contraindicaciones) ^{a b}

a. Alternativamente, cuando viajen a zonas rurales con bajo riesgo de malaria, la prevención frente a las picaduras de mosquito se combina con tratamiento de emergencia (SBET).

b En determinadas áreas con multiresistencia a fármacos, la quimioprofilaxis con mefloquina no está recomendada. En el presente esto incluye Camboya, Tailandia y el sudeste de Myanmar.

¹ A efectos de la presente publicación, el término país se refiere a países, territorios y áreas

² Hay que señalar que el requisito de vacunación de niños mayores de 6 meses exigido por algunos países no está de acuerdo con las recomendaciones de la OMS (véase Capítulo 6). Sin embargo, se debe informar al viajero sobre la existencia de dicho requisito para la entrada en esos países.

³ La OMS publica esos requisitos únicamente con propósitos informativos; esa publicación no constituye una obligación o confirmación de que dichos requisitos estén de acuerdo con lo recogido en el Reglamento Sanitario Internacional 2005.

⁴ Una descripción más detallada de las clasificaciones que definen las áreas de riesgo de transmisión del virus de la fiebre amarilla se encuentra en la Web www.who.int/ith/YFrisk.pdf. Estas clasificaciones dan sentido a las recomendaciones de vacunación mencionadas a continuación

AFGANISTÁN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo (*P. vivax* y *P. falciparum*) desde mayo a noviembre incluidos por debajo de 2.000 metros de altitud.

Prevención recomendada en áreas de riesgo: Tipo C.

ALBANIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de zonas con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

ALEMANIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

ANDORRA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

ANGOLA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad.

Recomendación de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

Paludismo: El riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, existe durante todo el año en todo el país.
Prevención recomendada: Tipo C.

ANGUILA (ANGUILLA)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a todos aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna.

ANTIGUA Y BARBUDA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

ANTILLAS HOLANDESAS (BONAIRE, CURAÇAO, SABA, SAN EUSTAQUIO, SAN MARTÍN)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 6 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

ARABIA SAUDÍ

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla, y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, principalmente de septiembre a enero incluidos en focos a lo largo de la frontera sur con Yemen (excepto en zonas de mayor altitud de la provincia de Asir). No hay riesgo en la Meca ni en Medina.

Prevención recomendada en áreas de riesgo: Tipo C.

Otras Recomendaciones: Meningitis Meningocócica tetravalente (A,C,Y,W), Polio y vacuna frente a la Gripe en los peregrinos al Umrah y Hajj.

ARGELIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: El riesgo de paludismo es limitado. Se han señalado pequeños focos de transmisión local (*P. vivax*) en las 6 wilayas del sur y sureste (*Adrar, El Oued, Ghardaia, Illizi, Ouargla, Tamanrasset*), con 59 casos locales de transmisión de *P. falciparum* y *P. vivax* notificados en 2012 en áreas bajo la influencia de la migración sub-sahariana

Prevención recomendada en zonas de riesgo: Tipo A.

ARGENTINA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

Recomendada a los viajeros ≥ 9 meses que viajan a las provincias de Misiones y Corrientes.

Generalmente no recomendada¹ a viajeros que se dirijan a la provincia de *Formosa* y áreas designadas de *Chaco*, *Jujuy*, y *Salta*.

No recomendada a viajeros que se dirijan a las provincias y departamentos no mencionados en la lista anterior.

Paludismo: El riesgo de paludismo, exclusivamente debido a *P. vivax*, es muy bajo y se encuentra confinado en los Departamentos de Orán y San Martín –en la provincia de Salta, en el norte del país-, y menos extendido en las provincias de Corrientes y Misiones. No hay riesgo en otras zonas del país.

Prevención recomendada en zonas de riesgo: Tipo A.

ARMENIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: no

AUSTRALIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para los viajeros más de 1 año procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y para los viajeros que hayan realizado tránsito durante más de 12 horas en el aeropuerto de un país con riesgo de transmisión de fiebre amarilla, con exclusión de las *Islas Galápagos* en Ecuador, la isla de *Tobago* y limitado a la provincia de *Misiones* en Argentina

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

AUSTRIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

AZERBAIYÁN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Riesgo de paludismo, debido exclusivamente a *P. vivax*, de junio a octubre inclusive en las zonas bajas, principalmente en el área entre los ríos *Kura* y *Arax*. No hay transmisión de la malaria en la ciudad de Bakú (la capital). En 2013 no se reportaron casos de transmisión local.

Prevención recomendada: Tipo A.

BAHAMAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para los viajeros de más de 1 año procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla con exclusión de Guyana, Surinam, y Trinidad y Tobago, pero incluyendo Santo Tomé y Príncipe, Somalia y la República Unida de Tanzania y a los viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas a través del aeropuerto de un país con riesgo de transmisión de fiebre amarilla (con las inclusiones y exclusiones anteriores).

¹ La vacunación contra la fiebre amarilla está *generalmente no recomendada* en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. Sin embargo, la vacunación debe considerarse en aquel pequeño subgrupo de viajeros que tiene un riesgo de exposición aumentado (p. Ej., viajes largos, exposición intensa al mosquito, incapacidad de evitar las picaduras). Cuando se considere la vacunación, cualquier viajero debe tener en cuenta el riesgo de infectarse con el virus de la fiebre amarilla, los requisitos de entrada de cada país y los factores de riesgo individuales para desarrollar un efecto adverso grave a la vacuna (p. Ej. el estado inmunitario, la edad)

BAHREIN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y para los viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas a través del aeropuerto de un país con riesgo de transmisión de fiebre amarilla..

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

BANGLADESH

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo durante todo el año, pero la transmisión se produce únicamente en las zonas rurales, en 13 de los 64 distritos. El riesgo es alto en los distritos de Chittagong Hill Tract (Bandarban, Rangamati y Khagrachari), del distrito de Chittagong y de distrito de Cox Bazar. Existe un bajo riesgo en los distritos de Hobigonj, Kurigram, Moulvibazar, Mymensingh, Netrakona, Sherpur, Sunamgonj y Sylhet. La mayoría de las partes del país, incluyendo la ciudad de Dhaka, no tienen riesgo de malaria..

Prevención recomendada en zonas de riesgo: Tipo C.

BARBADOS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla, excepto Guyana y Trinidad Tobago y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

BÉLGICA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

BELICE

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Riesgo de paludismo-predominantemente por *P. vivax* presenta en algunas zonas de *Stan Creek* y despreciable en otros lugares.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo A.

BENIN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo predominantemente por *P. falciparum* durante todo el año en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

BERMUDAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

BIELORRUSIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla y para los viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas a través del aeropuerto de un país con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

Recomendado para todos los viajeros de edad ≥ 9 meses que viajen al área situada al este de los Andes con altitudes inferiores a 2.300 m.: zonas enteras de los departamentos de *Beni*, *Pando* y *Santa Cruz*, y los designados de los departamentos de *Chuquisaca*, *Cochabamba*, *La Paz* y *Tarija*.

No se recomienda para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a áreas con altitudes superiores a 2300 m, y todas las zonas no mencionados anteriormente, incluyendo las ciudades de La Paz y Sucre.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo predominantemente por *P. vivax* (94%) todo el año en todo el país por debajo de 2.500 m. de altitud. Existe paludismo por *P. falciparum* en *Santa Cruz* y en los departamentos nortños de *Beni* y *Pando*, especialmente en las localidades de *Guayaramerín* y *Riberalta*.

Prevención recomendada en zonas de riesgo: Tipo B; en Beni, Pando y Santa Cruz, Tipo C.

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

BOTSWANA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes o que han pasado por países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla .

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, desde noviembre a mayo/junio en la zona norte del país: los distritos y subdistritos de *Bobirwa*, *Boteti*, *Chobe*, *Ngamiland*, *Okavango*, *Tutume*.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo C.

BRASIL

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Recomendada para los viajeros a partir de 9 meses de edad que se dirijan a los Estados de *Acre*, *Amapá*, *Amazonas*, *Distrito Federal* (incluyendo a la capital *Brasilia*) *Goiás*, *Maranhao*, *Mato Grosso*, *Mato Grosso do Sul*, *Minas*

Gerais, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins, y áreas indicadas de los siguientes estados: *Bahia, Paraná, Piauí, Río Grande do Sul, Santa Catarina y São Paulo*.

La vacunación se recomienda igualmente a los viajeros que visitan las cataratas de Iguazú.

No recomendada para los viajeros que se dirijan a áreas no mencionadas anteriormente, incluyendo las ciudades de *Fortaleza, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo*.

Paludismo: En los estados que se encuentren fuera de la zona “Amazonía Legal”, el riesgo de malaria es insignificante o no existe. El riesgo de paludismo - *P. vivax* (84%), *P. falciparum* (15%), infecciones mixtas (1%) - está presente en la mayor parte de las zonas boscosas situadas por debajo de los 900 metros de altitud en los nueve estados de la región del Amazonas (*Acre, Amapá, Amazonas, Maranhao* (parte oeste), *Mato Grosso* (parte norte), *Pará* (excepto la ciudad de Belém), *Rondônia, Roraima y Tocantins* –parte occidental-). La intensidad de la transmisión varía de un municipio a otro, pero es más alta en las zonas mineras de jungla, en asentamientos agrícolas, en áreas indígenas y en algunas zonas periurbanas de *Cruzeiro do Sul, Manaus y Pôrto Velho*. También hay paludismo en la periferia de las grandes ciudades como *Boa Vista, Macapá, Marabá, Rio Branco y Santarém*.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo C.

BRUNÉI DARUSSALAM

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Se han notificado casos de paludismo por *P. knowlesi*.

Prevención recomendada: Tipo A.

Otros requisitos: vacunación contra la poliomielitis para los viajeros procedentes de países donde la poliomielitis es endémica.

BULGARIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

BURKINA FASO

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

BURMA / BIRMANIA (véase MYANMAR)

BURUNDI

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, en todo el país durante todo el año.
Prevención recomendada: Tipo C.

BUTÁN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo todo el año en zonas focales del cinturón sur del país que comprende siete distritos: *Chukha, Dagana, Pemagatshel, Samdrup Jonkhar, Samtse, Sarpang y Zhemgang*. No se producen transmisiones en los siguientes cuatro distritos: *Burnthang, Gasa, Thimphu y Paro*. Hay focos de transmisión estacional durante los meses lluviosos del verano en el resto del país.

Prevención recomendada en las zonas y temporadas de riesgo: Tipo C.

CABO VERDE

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo limitado de paludismo predominantemente por *P.falciparum* desde Agosto a Noviembre incluyendo las *Islas de Santiago y Boavista* (1 caso local notificado en 2012)

Prevención recomendada en zonas de riesgo: Tipo A.

CAIMÁN, ISLAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

CAMBOYA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo por *P. falciparum* y *P. vivax* durante todo el año en todas las zonas rurales forestales, incluidas las zonas costeras. *Phnom Penh* y las zonas cercanas a *Tonle Sap* (Siem Reap) no están en riesgo. El riesgo en la zona turística de *Angkor Wat* es insignificante. Se ha informado de resistencia de *P. falciparum* a artesunato, mefloquina, lumefantrina y piperarquina en el oeste de Camboya y de resistencia del *P. vivax* a la cloroquina se en el este de Camboya.

Prevención recomendada: Tipo D

CAMERÚN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

CANADÁ

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

CANARIAS, ISLAS (véase ESPAÑA)

CHAD

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

Recomendada para viajeros a partir de 9 meses que viajen a las zonas del sur del desierto del Sahara.

No recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a áreas incluidas en el desierto del Sahara.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

CHILE

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

CHINA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros de más de 9 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, incluido *P. falciparum*, en Yunnan y en menor medida en Hainan. Se ha notificado *P. falciparum* resistente a la cloroquina y a la *sulfadoxina-pirimetamina*. Existe riesgo limitado de paludismo por *P. vivax* en las provincias del Sur y algunas centrales incluidas *Anhui, Ghuizhou, Henan, Hubei, y Jiangsu*. No existe riesgo de paludismo en áreas urbanas.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo B; en Hainan y Yunnan: Tipo C.

CHINA, HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

CHINA, MACAO (REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

CHIPRE

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

CHRISTMAS, ISLAS

(Océano Índico)

Fiebre amarilla:

Los mismos requisitos que para Australia continental.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

COLOMBIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

*Generalmente no se recomienda*¹ para los viajeros que se dirijan a las ciudades de Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín.

No se recomienda para los viajeros cuyos itinerarios se limitan a las áreas por encima 2300 m, el departamento de San Andrés y Providencia y la ciudad de Bogotá.

Paludismo: Existe alto riesgo de paludismo en algunos municipios de los departamentos de *Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Guajira, Nariño y Risaralda*. En un nivel inferior, el riesgo también está presente en algunos municipios de *Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada*. Se dan casos de *P. falciparum* resistente a la cloroquina.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo C.

COMORES (KOMORI/COMORAS)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

CONGO

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA (antes ZAIRE)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Recomendada para todos los viajeros mayores de 9 meses de edad, excepto lo indicado a continuación.

*Generalmente no recomendada*¹ para viajeros cuyo itinerario se limite a la provincia de Katanga.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominante por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país. Se ha notificado resistencia a la cloroquina y a la *sulfadoxina-pirimetamina*.

Prevención recomendada: Tipo IV.

COOK, ISLAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

COREA DEL NORTE (REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DE COREA)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de zonas con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe un riesgo limitado de paludismo, exclusivamente por *P. vivax*, en algunas zonas del sur.

Prevención recomendada: Tipo A.

COREA DEL SUR (REPÚBLICA DE COREA)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo limitado de paludismo, exclusivamente por *P. vivax*, principalmente en las áreas del norte de las provincias *Gangwon Do* y *Gyeonggi-do* y la ciudad de *Incheon* (hacia la zona desmilitarizada)

Prevención recomendada en áreas de riesgo: Tipo A.

COSTA DE MARFIL

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 9 meses de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum* durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

COSTA RICA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros de más de 9 meses de edad procedentes de zonas con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla (con excepción de Argentina, Panamá y Trinidad y Tobago) y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo históricamente debido casi exclusivamente a *P. vivax*. Existe un riesgo insignificante o nulo de transmisión del paludismo en el país, a excepción de un muy bajo riesgo en el cantón de Matina, provincia de Limón.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo A.

CROACIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

CUBA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

DINAMARCA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

DOMINICA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de mas de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

DOMINICANA, REPÚBLICA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, exclusivamente por *P. falciparum*, durante todo el año especialmente en las provincias occidentales de *Dajabón, Elias Pina* y *San Juan*. En otras áreas el riesgo de transmisión es bajo o insignificante. No hay datos de resistencia de *P. falciparum* a ningún antipalúdico.

Prevención recomendada las zonas de riesgo: Tipo B.

ECUADOR

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

Recomendada para todos los viajeros a partir de 9 meses de edad que viajen a las siguientes provincias del este de los Andes a altitudes por debajo de los 2300m: *Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbios y Zamora-Chinchi*.

*Generalmente no recomendada*¹ para viajeros cuyo itinerario se limite a las siguientes provincias del oeste de los Andes y a altitudes por debajo de los 2300m: *Esmeraldas, Guayas, Los Rios, Santa Helena, Santo Domingo de los Tsachilas* y áreas designadas de *Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua*.

No recomendada para aquellos viajeros cuyo itinerario se limite a todas las áreas por encima de 2300m de altitud, las ciudades de *Guayaquil y Quito*, y las islas *Galápagos*.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo - *P. vivax* (86%), *P. falciparum* (14%)-, a lo largo de todo el año, por debajo de 1.500 m., con riesgo de transmisión moderado en provincias de la costa. No hay riesgo en las ciudades de *Guayaquil, Quito* ni en otras ciudades de la región inter-andina.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo C.

EGIPTO

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

A todas las personas procedentes de Sudán se les exige o bien un certificado de vacunación o bien un certificado emitido por un centro oficial de Sudán en el que se indique que el viajero no ha estado en el sur de Sudán por debajo de los 15° de latitud N en los 6 días previos

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Puede existir riesgo muy limitado de paludismo por *P. falciparum* y *P. vivax* de junio a octubre incluidos en la provincia de *El Faiyûm* (no se ha notificado ningún caso autóctono desde 1998).

Prevención recomendada: ninguna

EL SALVADOR

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe un riesgo muy bajo de paludismo, casi exclusivamente por *P. vivax*, en zonas rurales bajo influencia migratoria de Guatemala. Se han notificado casos esporádicos de paludismo por *P. vivax* en otras partes del país.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo A.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

ERITREA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: En general, ninguna

Generalmente no recomendada¹ para los viajeros que se dirijan a los siguientes estados: *Anseba, Debub, Gash Barka, Mae Kel, y Semenawi Keih Bahri.*

No recomendada para el resto de áreas no mencionadas anteriormente, incluyendo las islas del archipiélago de *Dahlak.*

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum* y *P. vivax*, todo el año en todo el país por debajo de 2.200 metros de altitud. No existe riesgo en *Asmara.*

Prevención recomendada: Tipo C.

ESLOVAQUIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

ESLOVENIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

ESPAÑA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

ESTONIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna.

ETIOPIÁ

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Recomendada para todos los pasajeros a partir de 9 meses de edad excepto los mencionados a continuación.

*Generalmente no recomendada*¹ para viajeros cuyo itinerario se limite a las provincias de *Afar* y *Somali*.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, aproximadamente del 60% por *P. falciparum* y de un 40% para el *P. vivax*, durante todo el año y en todo el país por debajo de 2.000 metros de altitud. Se ha notificado resistencia de *P. vivax* a la *cloroquina*. No existe riesgo de paludismo en Addis Abeba.

Prevención recomendada en zonas de riesgo: Tipo C.

Otros requisitos: Vacunación contra la meningitis meningocócica

FEROE (Feroe), ISLAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

FIJI (FIDJI)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla .

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

FILIPINAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo durante todo el año por debajo de 600 metros de altitud excepto en las 23 provincias de *Aklan, Albay, Benguet, Bilaran, Bohol, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cebú, Guimaras, Iloilo, Norte y Sur de Leyte, Marinduque, Masbate, norte, este y oeste de Samar, Siquijor, Sorsogon, Surigao del norte* y el área metropolitana de Manila. Se considera que no existe riesgo alguno en las zonas urbanas ni en las llanuras. Se han notificado casos de infección humana por *P.knowlesi* en la provincia de Palawan.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo C.

FINLANDIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

FRANCIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

GABÓN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

GALÁPAGOS, ISLAS (véase ECUADOR)

GAMBIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, en todo el país, durante todo el año.

Prevención recomendada: Tipo C.

GEORGIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Puede existir riesgo limitado de paludismo, exclusivamente por *P. vivax*, en focos locales de junio a octubre incluidos en la parte este del país fronteriza con Azerbaiyán. No se han notificado casos en 2013.

Prevención recomendada en zonas de riesgo: Tipo A.

GHANA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum* en todo el país y durante todo el año.

Prevención recomendada: Tipo C.

GIBRALTAR

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

GRANADA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

GRECIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Puede existir riesgo muy limitado de malaria (solo por *P. vivax*) desde mayo a octubre en los pueblos del delta del río Evrotas en la provincia de *Laconia* (un área de 20 km²) en zonas agrícolas con gran población inmigrante. No hay riesgo en las zonas turísticas.

Prevención recomendada en zonas de riesgo: Tipo A.

GROENLANDIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

GUADALUPE

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

GUAM

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

GUATEMALA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. vivax*, por debajo de 1.500 metros de altitud durante todo el año. Existe un riesgo de moderado en los departamentos de *Escuintla* e *Izabal* y bajo riesgo en *Alta Verapaz*, *Baja Verapaz*, *Chiquimala*, *Petén*, *Suchitepéquez* y *Zacapa*.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo B.

GUAYANA FRANCESA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: El riesgo de paludismo, *P. falciparum* (45%), *P. vivax* (55%), es alto durante todo el año en 9 municipios del territorio fronterizo con Brasil (Valle del Río Oyapock) y *Surinam* (Valle del Río Maroni). En los otros 13 municipios el riesgo de transmisión es bajo o insignificante. Se ha notificado *P. falciparum* multirresistente en zonas influidas por la emigración brasileña.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo C.

GUINEA ECUATORIAL

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 6 meses procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

GUINEA-BISSAU

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

GUINEA (CONAKRY)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

GUYANA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla excepto de Argentina, Paraguay, Surinam y Trinidad y Tobago.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: El riesgo de paludismo - *P. vivax* (36%), *P. falciparum* (53%), infecciones mixtas (11%)- es alto a lo largo de todo el año en todas las partes del interior. El riesgo es mayor en las regiones 1, 7, 8 y 9; y muy bajo en las regiones 3, 4, 5 y 6. Se han notificado casos esporádicos de paludismo en el cinturón costero densamente poblado. Se ha notificado *P. falciparum* resistente a la cloroquina.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo C.

HAITÍ

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, exclusivamente por *P. falciparum*, a lo largo de todo el año. No se ha notificado resistencia del *P. falciparum* a la cloroquina.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo B o C si no se dispone de *cloroquina* antes del viaje.

HOLANDA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

HONDURAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla (con la excepción de Panamá en ambos casos).

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Hay riesgo de paludismo debido a *P. vivax* (91%), *P. falciparum* (8,5%) e infecciones mixtas (~0,5%). El riesgo por *P. vivax* es alto en las provincias de *Gracias a Dios* y *Colón*, y moderado en las provincias de *Atlántida*, *Olancho* y *Yoro*. El riesgo de transmisión de *P. falciparum* es alto en *Gracias a Dios*, y también se han notificado algunos casos en *Colón*, *Olancho* y *Yoro*.

Prevención recomendada: Tipo B.

HONG KONG –REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CHINA (VER CHINA, HONG KONG).

HUNGRÍA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

INDIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Todos (excepto los recién nacidos hasta la edad de 6 meses) los que lleguen por vía aérea o marítima sin un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla serán mantenidos en aislamiento durante un máximo de 6 días si esa persona (i) llega dentro de los 6 días posteriores a la salida de un área con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla, o (ii) ha estado en tal lugar en tránsito (con excepción de los pasajeros y miembros de la tripulación que, mientras que estuvo en tránsito a través de un aeropuerto situado en un área con riesgo de transmisión de fiebre amarilla, se mantuvo en las instalaciones del aeropuerto durante la totalidad de su estancia y la autoridad sanitaria se compromete a tal exención), o (iii) llega en un barco que partió de o tocó cualquier puerto en una zona con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla hasta 30 días antes de su llegada a la India, a menos que ese buque hubiera sido desinsectado de conformidad con el procedimiento establecido por la OMS, o (iv) llega en un avión que ha estado en una zona con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y no ha sido desinsectado de acuerdo con las Reglas Indias en Salud Pública de aeronaves de 1954, o según lo recomendado por la OMS.

Se consideran zonas de riesgo de transmisión de la fiebre amarilla los países y zonas siguientes:

África: Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur, Togo y Uganda.

América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guayana, Surinam, Trinidad (Trinidad solamente), Panamá, Paraguay, Perú y República Bolivariana de Venezuela.

Nota. Cuando en cualquier país se informa de un caso de fiebre amarilla, ese país es considerado como un país con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla por el Gobierno de la India y se añade a la lista anterior.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla para los viajeros: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo durante todo el año en todo el país por debajo de 2.000 metros de altitud, con el 40%-50% de los casos debidos al *P. falciparum* y el resto debido a *P. vivax*. No existe transmisión en parte de los estados de *Himachal Pradesh*, *Jammu y Cachemira*, y *Sikkim*. El riesgo de paludismo por *falciparum* es relativamente alto en los estados del noreste, en las *Islas de Andaman y Nicobar*, *Chhattisgarh*, *Gujarat*, *Jharkhand*, *Karnataka* (con la excepción de la ciudad de *Bangalore*), *Madhya Pradesh*, *Maharashtra* (excepto en las ciudades de *Mumbai*, *Nagpur*, *Nasik* y *Pune*), *Orissa* y *West Bengal* (excepto en la ciudad de *Kolkata*). **Prevención recomendada en áreas de riesgo:** Tipo C.

Otros requisitos: Vacunación oral contra la poliomielitis al menos cuatro semanas antes de la salida para viajeros nacionales residentes en países donde la poliomielitis es endémica (Afganistán, Nigeria y Pakistán) y los países con circulación del virus de la poliomielitis tras su importación (Etiopía, Kenia, Somalia, República Árabe de Siria).

INDONESIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo durante todo el año y en la mayoría de las áreas de las cinco provincias orientales de Este de *Nusa Tenggara*, *Maluku*, Norte de *Maluku*, *Papua* y *Papua Oeste*. En otras partes del país hay riesgo de paludismo en algunos distritos excepto en el municipio de Yakarta, en ciudades y zonas urbanas y en las áreas de los principales centros turísticos. Se ha notificado *P. falciparum* resistente a la cloroquina y a la *sulfadoxina-pirimetamina*. Se ha notificado resistencia del *P. vivax* a la *cloroquina*. Se ha notificado infección por *P. knowlesi* en la provincia de *Kalimantan*.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo C.

IRAK

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros con más de 6 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna.

Paludismo: Existe riesgo limitado de paludismo, casi exclusivamente por *P. vivax*, desde mayo a noviembre incluidos en las áreas del norte por debajo de 1.500 metros de altitud (provincias de *Duhok*, *Erbil* y *Sulaimaniya*). No se han notificado casos indígenas desde 2009.

Prevención recomendada: Ninguna.

Otros requisitos: Vacuna oral contra la poliomielitis.

IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo por *P.vivax* y *P. falciparum* desde marzo a noviembre incluidos en las zonas rurales de las provincias de Hormozgan y Kerman (zona tropical) y la parte sur de *Sistan-Baluchistan*.

Prevención recomendada: Tipo C.

IRLANDA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

ISLANDIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

ISRAEL

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

ITALIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

JAMAICA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

JAPÓN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

JORDANIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

KAZAKJSTÁN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

KENIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

Recomendada para los viajeros a partir de 9 meses de edad excepto los mencionados a continuación.

*Generalmente no recomendada*¹ para los viajeros cuyo itinerario se limita a las áreas siguientes: la totalidad de la Provincia el Noreste; los estados de *Kilifi*, *Kwale*, *Lamu*, *Malindi* y *Tanariver* en la provincia Costera, y las ciudades de Nairobi y Mombasa.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país. El riesgo es normalmente muy reducido en la ciudad de Nairobi y en las altiplanicies (por encima de 2.500 metros) de las provincias *Central*, *Nyanza*, *Oriental*, *Occidental* y *Valle de Rift*.

Prevención recomendada: Tipo C.

KIRGUISTÁN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de mas de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, exclusivamente por *P. vivax*, de junio a octubre incluidos en algunas zonas del sur y oeste del país, principalmente en zonas fronterizas con *Tadyikistán* y *Uzbekistán*, (regiones de *Batken*, *Osh* y *Jalal-Abad*) y en las afueras de *Bishkek*. No se ha informado de casos locales entre 2011 y 2013.

Prevención recomendada: Tipo A.

KIRIBATI

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

KUWAIT

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

LAOS, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país, salvo en Vientiane.

Prevención recomendada: Tipo C.

LESOTHO

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros de más de 9 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y para aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

LETONIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: no

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

LÍBANO

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla y para aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

LIBERIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

LIBIA

Fiebre amarilla

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

LIECHTENSTEIN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

LITUANIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

LUXEMBURGO

Fiebre amarilla

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MACAO – REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CHINA (VER CHINA, MACAO REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL)

MACEDONIA, ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MADAGASCAR

Fiebre amarilla

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo:

Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, todo el año y en todo el país, siendo las zonas costeras las de mayor riesgo.

Prevención recomendada: Tipo C.

MADEIRA, ISLAS (véase PORTUGAL)

MALASIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Sólo existe riesgo de paludismo en focos limitados de zonas interiores de los estados de Sabah y Sarawak y en la zona central de la península de Malasia. Las áreas urbanas, suburbanas y costeras están libres de paludismo. Se han notificado infecciones humanas por *P. knowlesi*. Se ha notificado *P. vivax* resistente a la cloroquina.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo C.

MALAWI

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

MALDIVAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MALÍ

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

Recomendada para todos los viajeros mayores de 9 meses que viajan a zonas del sur del desierto del Sahara.

No recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a áreas del desierto del Sahara.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

MALTA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. Los niños menores de 9 meses de edad procedentes de zonas con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla pueden ser aislados o puestos bajo vigilancia si se considera justificado desde el punto de vista epidemiológico. No se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros que hayan realizado tránsitos en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MALVINAS, ISLAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MARIANAS DEL NORTE, ISLAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MARRUECOS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MARSHALL, ISLAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MARTINICA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MAURICIO

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MAURITANIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

Recomendada para todos los viajeros mayores de 9 meses que viajan a zonas del sur del desierto del Sahara.

No recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a áreas del desierto del Sahara.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país, con excepción de las regiones del Norte (Dakhlet-Nouadhibou y Tiris-Zemour). En *Adrar e Inchiri* existe riesgo de paludismo durante la estación de las lluvias (de julio a octubre incluidos).

Prevención recomendada en las zonas de riesgos: Tipo C.

MAYOTTE (COLECTIVIDAD TERRITORIAL FRANCESA)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo todo el año, predominante por *P. falciparum*.

Prevención recomendada: Tipo C.

MÉXICO

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo debido casi exclusivamente a *P. vivax* presente de forma intermitente a lo largo del año en algunas áreas rurales que no son visitadas a menudo por los turistas. Bajo riesgo en algunas localidades de los estados de *Chiapas* (Costa) y localidades con muy bajo riesgo localizado en los estados de *Chihuahua*, *Durango*, *Nayarit*, *Quintana Roo* y *Sinaloa*.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo moderado: Tipo A

MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MOLDAVIA (Moldova), REPÚBLICA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MÓNACO

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MONGOLIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MONTENEGRO

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MONTSERRAT

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

MOZAMBIQUE

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

MYANMAR (ANTIGUA BIRMANIA)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, principalmente por *P. falciparum* durante todo el año en las zonas rurales, boscosas y montañosas del país, así como en la zona costera del estado de *Rakhine*. No hay transmisión en las ciudades y zonas urbanas. La planicie central y la zona seca generalmente están libres de paludismo, si bien aún existen algunos focos de transmisión. Se ha notificado resistencia a la *mefloquina* en el estado de *Kayin* y en la parte oriental del estado de *Shan*. Se sospecha resistencia emergente a la artemisina en el sureste de Myanmar. Se ha notificado *P. vivax* resistente a *cloroquina*. Se han notificado infecciones en humanos por *P. knowlesi*

Prevención recomendada en áreas de riesgo: Tipo C.

NAMIBIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. Se consideran zonas con riesgo de transmisión los países o partes de países situados en zonas endémicas de África y América del Sur. No se exige certificado a los pasajeros de líneas aéreas regulares que hayan iniciado su viaje fuera de países con riesgo de transmisión aunque hayan pasado en tránsito por tales países si no han salido del aeropuerto de escala o la ciudad adyacente durante el mismo. Todos los pasajeros que hayan comenzado su viaje en un país con riesgo de transmisión o hayan pasado en tránsito por una de dichos países y no viajen en un avión de línea regular deben presentar un certificado. No se exige certificado a los niños menores de 1 año de edad, pero podrán ser sometidos a vigilancia.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo desde noviembre a junio, predominantemente por *P. falciparum*, en las siguientes regiones: *Ohangwena*, *Omaheke*, *Omusati*, *Oshana*, *Oshikoto* y *Otjozondjupa*. Existe riesgo durante todo el año a lo largo del río *Kunene* y en las regiones de *Kavango* y *Caprivi*.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo C.

NAURÚ

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

NEPAL

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. vivax*, todo el año en las zonas rurales de los 20 distritos de *Terai* fronterizos con la India, con brotes ocasionales de *P. falciparum* de julio a octubre incluidos. Hay transmisión estacional por *P. vivax* en 45 distritos de la zona interior de *Terai* y en las colinas intermedias.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo C.

NICARAGUA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguna.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe bajo riesgo de paludismo, predominantemente por *P. vivax* (82%), todo el año en numerosos municipios, principalmente en la Región Autónoma del Atlántico Norte, con transmisión esporádica en *Boaca*, *Chinandega*, *León*, *Jinotega* y *Matagalpa*. Se han notificado casos desde otros municipios de los departamentos del centro y oeste, pero el riesgo de transmisión en estas áreas se considera muy bajo o insignificante.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo B.

NÍGER

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad y se recomienda para todos los viajeros que salgan de Níger.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

Recomendada para todos los viajeros mayores de 9 meses de edad que se dirijan a áreas al sur del desierto Sahara.

No recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a áreas del desierto del Sahara.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, todo el año en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

NIGERIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

NIUE

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

NORFOLK, ISLA (véase AUSTRALIA)

NORUEGA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Nota. En caso de amenaza epidémica al territorio podría exigirse un certificado de vacunación específico.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

NUEVA ZELANDA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

OMÁN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Puede existir transmisión esporádica de *P. falciparum* y *P. vivax* como consecuencia de la importación internacional de los parásitos. En 2010 se notificaron brotes locales de *P. falciparum* y *P. vivax* en la región de North Sharqiya. También se han notificado casos locales en 2011 y 2012.

Prevención recomendada: ninguna.

PAKISTÁN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses de edad procedentes de cualquier parte de un país en donde haya riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo por *P. vivax* y *P. falciparum* durante todo el año y en todo el país por debajo de 2.000 metros de altitud, especialmente en zonas rurales entre junio y septiembre inclusive.

Prevención recomendada: Tipo C.

PALAU (PALAUS)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

PANAMÁ

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

Recomendada para todos los viajeros a partir de 9 meses de edad que se dirijan a la región del Este del Canal de Panamá (la totalidad de las comarcas de *Emberá* y *Kuna Yala*, la provincia de *Darién*, y áreas de las provincias de *Colón* y *Panamá* que se encuentran al este de la zona del Canal).

No recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a áreas del oeste de la zona del canal, la ciudad de Panamá, la zona del canal en sí, y las Islas de Balboa y San Blas.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. vivax* (99%) todo el año en las provincias situadas a lo largo de la costa Atlántica y de la frontera con Costa Rica y con Colombia: *Bocas de Toro*, *Chiriquí*, *Colón*, *Darién*, *Kuna Yala*, *Ngäbe Bugle*, *Panamá* y *Veraaguas*. En Ciudad de Panamá, en la zona del Canal, y en las otras provincias no hay un riesgo significativo de transmisión.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo **B**; en zonas endémicas del este, Tipo **C**.

PAPÚA - NUEVA GUINEA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país por debajo de 1.800 metros de altitud. Se ha notificado resistencia del *P. vivax* a la *cloroquina*.

Prevención recomendada: Tipo **C**.

PARAGUAY

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

Recomendada para todos los viajeros a partir de 9 meses excepto los indicados a continuación.

*Generalmente no recomendada*¹ para viajeros cuyo itinerario se limite a la ciudad de Asunción.

Paludismo: El riesgo de paludismo, exclusivamente por *P. vivax*, es moderado en algunos municipios de los departamentos de Alto Paraná y *Caaguazú*. En los otros departamentos el riesgo de transmisión no existe o es insignificante.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo **A**.

Otros requisitos: Vacunación contra sarampión y rubeola.

PERÚ

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: sí.

Recomendada para los viajeros a partir de 9 meses de edad que se dirijan a las áreas siguientes por debajo de 2.300 metros de altitud: todas las regiones del *Amazonas*, *Loreto*, *Madre de Dios*, *San Martín*, *Ucayali*, *Puno* y *Cuzco*; *Pasco*, *Huánuco* y las áreas indicadas de las regiones siguientes: norte y este de *Ancash*; norte de *Apurímac*; norte y noreste de *Ayacucho*; norte y este de *Cajamarca*; norte de *Huancavelica*; este de *La Libertad* y este de *Piura*.

*Generalmente no recomendada*¹ para viajeros cuyo itinerario se limite a las áreas siguientes del oeste de los Andes: la totalidad de las regiones de *Lambayeque* y *Tumbes* y las áreas indicadas del oeste de *Piura* y parte centro y oeste de *Cajamarca*.

No recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a las áreas siguientes: todas aquellas por encima de 2300 m de altitud, áreas al oeste de los Andes no mencionadas anteriormente. Las ciudades de *Cuzco* y *Lima*, *Machu Picchu*, y el Camino del Inca.

Paludismo: El riesgo de paludismo, *P. vivax* (87%), *P. falciparum* (13%), existe todo el año en áreas rurales por debajo de los 2000 metros de altitud. Los 23 distritos de alto riesgo se concentran en las regiones de *Ayacucho*, *Loreto*, *Madre de Dios*, *Piura* y *Pasco*. El 99% de los casos de *P. falciparum* se notifican en *Loreto*, departamento

situado en la Amazonia, el cual también alberga 17 de los distritos de más alto riesgo del país. Se ha notificado *P. vivax* resistente a *cloroquina*.

Prevención recomendada: Tipo **B** en zonas de riesgo de *P. vivax*; Tipo **C** en el departamento de Loreto.

PITCAIRN, ISLAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

POLINESIA FRANCESA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

POLONIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

PORTUGAL

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

PUERTO RICO

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

QATAR

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

REINO UNIDO (con las Islas Anglonormandas y la Isla de Man)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 9 meses de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C

REPÚBLICA CHECA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

REUNIÓN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

RUANDA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: tipo C.

RUMANÍA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

RUSIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: no

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Puede existir riesgo muy limitado de paludismo, exclusivamente por *P. vivax*, en áreas de intensa influencia migratoria proveniente de países del sur de la Confederación de Estados Independientes.

Prevención recomendada: ninguna.

SALOMÓN, ISLAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año, salvo en algunos islotes del este y del sur. Se ha notificado *P. vivax* resistente a cloroquina

Prevención recomendada: Tipo C.

SAMOA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

SAMOA AMERICANA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

SAN MARINO

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

SAN PEDRO Y MIQUELÓN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

SANTA ELENA (Santa Helena)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

SANTA LUCÍA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: No

Generalmente no recomendada¹ a viajeros con destino a Santo Tomé y Príncipe.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año.

Prevención recomendada: Tipo C.

SENEGAL

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país; el riesgo es menor en las regiones del centro-oeste entre enero y junio inclusive.

Prevención recomendada: Tipo C.

SERBIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

SEYCHELLES

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad que procedan de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna.

SIERRA LEONA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

SINGAPUR

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exigen certificados de vacunación a todos los viajeros mayores de 1 año de edad que, en los 6 días previos, hayan estado en países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla o hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla..

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna.

Paludismo: Se han notificado casos de infección humana por *P. knowlesi*.

Prevención recomendada en zonas de riesgo de *P. knowlesi*: Tipo A.

SIRIA, REPÚBLICA ÁRABE

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna.

Paludismo: Puede existir riesgo muy limitado de paludismo, exclusivamente por *P. vivax*, desde mayo hasta octubre incluidos, focalmente a lo largo de la frontera norte, especialmente en zonas rurales de la Gobernación de *El Hasaka* (no se han notificado casos autóctonos desde 2005 aunque no se tienen informes desde 2010).

Prevención recomendada: ninguna.

Otros requerimientos: Vacuna oral de poliomielitis para viajeros provenientes de áreas infectadas (Afganistán, Nigeria, Pakistán)

SOMALIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: En general, no

Generalmente no recomendada¹ para viajeros que se dirijan a las siguientes regiones: Bakool, Banaadir, Bay, Gado, Galgadud, Hiran, Lower Juba, Middle Juba, Lower Shabelle and Middle Shabelle.

No recomendada en el resto de áreas no mencionadas anteriormente.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país. Hay riesgo estacional relativamente bajo en el norte. Es más alto en el centro y sur del país. Se ha notificado

Prevención recomendada: Tipo C.

SRI LANKA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses de edad procedentes de cualquier parte de un país en donde haya riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Ninguna.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo por *P. vivax* (88%), *P. falciparum* (12%) durante todo el año, excepto en los distritos de *Colombo, Galle, Gampaha, Kalutara, Matara y Nuwara Eliya.*

Prevención recomendada en zonas de riesgo: Tipo A.

SUDÁFRICA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla, de Eritrea, Santo Tomé y Príncipe, la República Unida de Tanzania, Zambia y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año en las zonas de baja altitud de la Provincia de *Mpumalanga* (incluido el *Parque Nacional de Kruger*), la Provincia de Limpopo y el nordeste de *Kwazulu-Natal*, hasta el río *Tugela*, en el sur. El riesgo es más alto de octubre a mayo, incluidos.

Prevención recomendada en áreas de riesgo: Tipo C

SUDÁN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. Puede exigirse un certificado a los viajeros que dejan Sudán.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

Recomendada para todos los viajeros mayores de 9 meses que viajen a zonas del sur del desierto del Sahara.

No recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a áreas en el desierto del Sahara y en la ciudad de Jartum.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país. El riesgo es bajo y estacional en el norte. Es mayor en el centro y sur del país. Es muy limitado en la costa del mar Rojo.

Prevención recomendada: Tipo C.

SUDÁN DEL SUR

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

Paludismo: Existe riesgo de transmisión, predominantemente por *P. falciparum* durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

SUECIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

SUIZA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

SURINAM

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: El riesgo de paludismo, *P. falciparum* (40%), *P. vivax* (58%), infecciones mixtas (2%), continua disminuyendo en los últimos años. Ocurre a lo largo de todo el año en el interior del país más allá del área costera de sabana, con el riesgo más alto a lo largo de la frontera este y en las áreas de minas de oro. En la ciudad de Paramaribo y en los otros 7 distritos costeros, el riesgo de transmisión es bajo o insignificante. Se ha notificado *P. falciparum* resistente a la cloroquina, a la *sulfadoxina-pirimetamina* y a la *mefloquina*. También se ha notificado una cierta reducción de la sensibilidad a la quinina.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo C.

SWAZILANDIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año en todas las zonas de sabana de baja altitud (principalmente *Big Bend*, *Mhlume*, *Simunye* y *Tshaneni*). El riesgo más alto se da entre Noviembre y Mayo inclusive.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo C.

TADYIKISTÁN (Tayikistán)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. vivax*, desde junio a octubre incluidos, principalmente en zonas del sur (Región de *Khaltan*) y en algunas áreas del centro (*Dushanbe*), oeste (*Gorno-Badakhshan*) y norte (región de *Leninabad*). Se ha notificado *P. falciparum* resistente a la cloroquina y a la sulfadoxina-pirimetamina en la parte sur del país.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo B; en las zonas del sur cerca de la frontera con Afganistán: C

TAILANDIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo durante todo el año en las zonas rurales, en particular en bosques y colinas de todo el país, principalmente hacia las fronteras internacionales, incluyendo las provincias más sureñas. No existe riesgo en las ciudades (ej. *Bangkok*, *Chiangmai*, *Pattaya*), zonas urbanas, en la isla de *Samui* ni en los principales centros turísticos de la isla de *Phuket*. Sin embargo, existe riesgo en algunas otras zonas e islas. Existe resistencia a la mefloquina y a la quinina en las zonas fronterizas con Camboya y Myanmar. Se ha notificado resistencia a la artemisina en la zona cercana a la frontera con Myanmar. Se ha notificado *P. vivax* resistente a la cloroquina. Se ha notificado infección humana por *P. knowlesi*.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo A; en zonas próximas a la frontera con Camboya y Myanmar: Tipo D.

TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA

TIMOR ORIENTAL (Timor Leste)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

TOGO

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros mayores de 1 año de edad.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C

TOKELAU

(Territorio no autónomo de Nueva Zelanda)

Los mismos requisitos que Nueva Zelanda.

TONGA

Fiebre amarilla:

Requisitos de país: ninguno.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

TRINIDAD Y TOBAGO

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí.

Recomendada para los viajeros a partir de 9 meses de edad que se dirijan a la isla de Trinidad, excepto los mencionados a continuación.

*Generalmente no recomendada*¹ para los viajeros cuyo itinerario se limita a las áreas urbanas de Puerto de España, pasajeros de crucero que no desembarquen y pasajeros en tránsito aéreo.

No recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a la isla de Tobago.

TÚNEZ

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

TURKMENISTAN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

TURQUÍA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo limitado de paludismo, exclusivamente por *P. vivax*, desde mayo a octubre inclusive, en las siguientes provincias: *Diyarbakir, Mardin y Sanliurfa*. Durante 2013 se han notificado unos pocos casos esporádicos. No hay riesgo de paludismo en las principales zonas turísticas del oeste y sudoeste del país.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo A.

TUVALU

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

UCRANIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

UGANDA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

URUGUAY

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

UZBEKISTÁN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: existe riesgo limitado de paludismo, exclusivamente a *P. vivax*, de junio a octubre incluidos en algunos pueblos localizados en la parte sur y este del país en la frontera con Tajikistan, Kirgizstan y Afganistán. No se ha informado de casos locales entre 2011 y 2013

Prevención recomendada en áreas de riesgo: Tipo A.

VANUATU

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo de bajo a moderado, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país. Se ha notificado *P. vivax* resistente a la cloroquina.

Prevención recomendada: Tipo C

VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: Sí

Recomendada para todos los viajeros a partir de 9 meses de edad excepto los citados a continuación.

*Generalmente no recomendada*¹ para viajeros cuyo itinerario se limita a las áreas siguientes: los estados de Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas, Yaracuy y el Distrito Federal (Mapa).

No recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a áreas siguientes: todas las zonas con altitud > 2300 m. en los estados de Trujillo, Mérida y Tachira; los estados de Falcon y Lara, Isla Margarita, y las ciudades de Caracas y Valencia.

Paludismo: Existe riesgo moderado-alto de paludismo por *P. vivax* (75%) y *P. falciparum* (25%), a lo largo de todo el año en algunas zonas rurales de los estados de Amazonas, Anzoátegui, Bolívar y Delta del Amacuro. Existe riesgo bajo en los estados de Apure, Monagas, Sucre y Zulia. El riesgo de paludismo por *P. falciparum* está principalmente

restringido a municipios de zonas de jungla de Amazonas (*Alto Orinoco, Atabapo, Atures, Autana, Manapiare*) y Bolívar (*Cedeño, El Callao, Heres, Gran Sabana, Piar, Raúl Leoni, Rocio, Sifontes y Sucre*).

Prevención recomendada: Tipo **B** en zonas de riesgo de *P. vivax*; Tipo **C** en zonas de riesgo de *P. falciparum*.

VIETNAM

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, en todo el país, excepto en los núcleos urbanos, el delta del río Rojo, el delta del Mekong, y las llanuras costeras del centro de Vietnam. Las áreas de mayor riesgo son las zonas altas por debajo de 1.500 m. de altitud, al sur de 18° N, principalmente las cuatro provincias altas centrales de *Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai* y *Kon Tum*, provincia de *Binh Phuoc* y la parte oeste de las provincias costeras de *Khanh Hoa, Ninh Thuan, Quang Nam* y *Quang Tri*. Se ha notificado resistencia a la *mefloquina*.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo **C**.

VÍRGENES AMERICANAS, ISLAS

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

WAKE, ISLAS

(Territorio de Estados Unidos)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: ninguno

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

YEMEN

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año, pero especialmente de septiembre a febrero incluidos, en todo el país por debajo de 2.000 m. de altitud. No existe riesgo en la ciudad de *Sana'*. El riesgo de paludismo en la Isla de *Socotra* es muy limitado. Se ha notificado resistencia a la cloroquina y a la *sulfadoxina-pirimetamina*.

Prevención recomendada en las zonas de riesgo: Tipo **C**; Isla de *Socotra*: Tipo **A**.

YIBUTI (DJIBOUTI)

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo **C**.

ZAIRE (véase CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA)

ZAMBIA

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos superiores a 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: en general, no.

*Generalmente no recomendada*¹ a viajeros cuyo itinerario se limita a las áreas siguientes: las provincias del Oeste y del Noroeste en su totalidad.

No recomendada para el resto de las áreas no mencionadas anteriormente.

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, durante todo el año y en todo el país.

Prevención recomendada: Tipo C.

ZIMBABWE

Fiebre amarilla:

Requisitos del país: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos superiores a 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla.

Recomendaciones de vacunación contra la fiebre amarilla: ninguna

Paludismo: Existe riesgo de paludismo, predominantemente por *P. falciparum*, de noviembre a junio incluidos en zonas por debajo de 1.200 metros de altitud y durante todo el año en el valle de Zambezi. En *Bulawayo* y *Harare*, el riesgo es insignificante.

Prevención recomendada en áreas de riesgo: Tipo C.